

令和8年度 平群町定期予防接種の実施について (A類)

予防接種	標準的な接種年齢	対象	標準的な接種方法		予診票
小児用肺炎球菌	初回接種：生後2か月～7か月未満に接種開始 追加接種：1歳～1歳3か月未満の間に1回	生後2か月～5歳に至るまでの間にある者	生後2か月～7か月未満に接種開始	初回接種：27日以上の間隔をあけて3回接種（生後1歳までに完了） 追加接種：初回（3回）終了後60日以上あけて、生後1歳以降に1回接種【ただし標準的には12か月～15か月に至るまでの間】	出生時（転入時）に配布
			生後7か月～1歳未満に接種開始	初回接種：27日以上の間隔をあけて2回接種（生後1歳までに完了） 追加接種：初回（2回）終了後60日以上あけて、生後1歳以降に1回接種	
			1歳～2歳未満に接種開始	60日以上の間隔をあけて2回接種	
			2歳～5歳未満に接種開始	1回接種	
B型肝炎	生後2か月～9か月未満	生後1歳に至るまでの間にある者	27日以上の間隔をあけて2回接種した後、第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて（20週以降の同曜日以降）1回接種（計3回） 【ただし、母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリンと併用してB型肝炎ワクチンを接種したことがある場合は定期接種の対象外】		出生時（転入時）に配布
ロタリックス（1価）	生後2か月～出生14週6日後までの間に初回接種開始 ※安全性の観点から、出生15週0日後以降の初回接種はおすすめしません	出生6週0日後～24週0日後までの間にある者	生後2か月～出生14週6日後までの間に接種開始	27日以上の間隔をあけて2回経口投与	ただし腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者（その治療が完了した者を除く）、重症複合免疫不全症の所見が認められる者
ロタテック（5価）		出生6週0日後～32週0日後までの間にある者		27日以上の間隔をあけて3回経口投与	
混合接種	5種混合	生後2か月～7歳6か月に至るまでの間にある者	1期 初回接種：20日～56日までの間隔をあけて3回接種 追加接種：初回接種終了後6か月以降に1回接種【ただし標準的には3回目終了後、6か月～1年6か月までの間隔をあける】		-
	4種混合 3種混合		1期 初回接種：20日～56日までの間隔をあけて3回接種 追加接種：初回接種終了後6か月以降に1回接種【ただし標準的には3回目終了後、1年～1年6か月までの間隔をあける】		
ポリオ	初回接種：生後2か月～1歳未満 追加接種：初回（3回）終了後1年～1年6か月の間に1回	生後2か月～7歳6か月に至るまでの間にある者	1期 初回接種：20日～56日までの間隔をあけて3回接種 追加接種：初回接種終了後6か月以降に1回接種【ただし標準的には3回目終了後、1年～1年6か月までの間隔をあける】		-
ヒブ	初回接種：生後2か月～7か月未満に接種開始 追加接種：初回（3回）終了後7か月～13か月の間に1回	生後2か月～5歳に至るまでの間にある者	生後2か月～7か月未満に接種開始	初回接種：27日～56日の間隔をあけて3回接種（生後1歳までに完了） 追加接種：初回（3回）終了後、7か月以上あけて1回接種【ただし標準的には3回目終了後、7か月～1年1か月までの間隔をあける】	-
			生後7か月～1歳未満に接種開始	初回接種：27日～56日の間隔をあけて2回接種（生後1歳までに完了） 追加接種：初回（2回）終了後、7か月以上あけて1回接種【ただし標準的には2回目終了後、7か月～1年1か月までの間隔をあける】	
			生後1歳～5歳未満に接種開始	1回接種	
BCG	生後5か月～8か月未満	生後1歳に至るまでの間にある者	1回接種		出生時（転入時）に配布
麻しん風しん（MR） または麻しん または風しん	1期：1歳～2歳に至るまでの間にある者 ※特例対象：令和4年4月2日～令和5年4月1日生で未接種の者		1回接種 （※特例は令和9年3月未まで）		出生時（転入時）に配布
	2期：小学校就学前の1年間にある者 （令和2年4月2日～令和3年4月1日生） ※特例対象：小学校2年生相当で未接種の者		1回接種 （※特例は令和9年3月未まで）		
水痘	初回接種：生後12か月～15か月未満 追加接種：初回終了後半年～1年の間に1回	生後1歳～3歳に至るまでの間にある者	3か月以上の間隔をあけて2回接種 【ただし標準的には初回終了後、半年～1年までの間隔をあける】 ※既に水痘にかかったことがある人は対象外となります		出生時（転入時）に配布
日本脳炎	1期初回接種：3歳代に2回 1期追加接種：4歳代に1回	生後6か月～7歳6か月に至るまでの間にある者	初回接種：6日～28日までの間隔をあけて2回接種 追加接種：初回接種終了後概ね1年後に1回接種 ※3歳未満で接種する場合はワクチン半量（0.25ml）		小4で送付
	2期：小学4年生 （平成28年4月2日～平成29年4月1日生）	9歳～13歳未満の者	1回接種		
	※特例対象：平成7年4月2日～平成19年4月1日生 （20歳になる前日まで）		1・2期の不足分を接種（令和9年3月未まで）		
2種混合（DT）	小学6年生 （平成26年4月2日～平成27年4月1日生）	11歳～13歳未満の者	1回接種		小6で送付
子宮頸がん（HPV）	中学1年生の女子 （平成25年4月2日～平成26年4月1日生）	小学校6年生～高校1年生相当の女子	初回、2か月後、初回から6か月後の3回接種 ※1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、初回、6か月後の2回接種で完了することができます		中1（女子）で送付
RS母子免疫ワクチン	妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方		妊娠ごとに1回（筋肉内に接種）		妊娠届出時配布

※「●歳未満」「●歳に達するまで」「●歳に至るまで」はいずれも「●歳の誕生日の前日まで」となります。